

REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Lutz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLIII

MARÇO - 1968

N. 1

UM NOVO GÊNERO DE MÂNTIDA BRASILEIRO DA SUBFAMÍLIA *Thespinae* COM DUAS ESPÉCIES NOVAS

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de S. Paulo — Piracicaba

Metathespis g. n.

Statura gracilis, caput pronoto valde latius, oculi permagni, rotundati, prominentes, scutellum faciale transversum, superne in medio regulariter curvum, vertex quadrisulcatus, sulcis praeocularibus reliquis profundioribus, antennae filiformes ciliatae; pronotum coxis anticis longius, laeve, modice carinulatum, ad implantationem coxarum anticarum modice ampliatum, marginibus lateralibus minutissime dentatum, pedes anteriores coxis extus ad apicem lobulo parvulissimo armatis, femoribus superne rectis, in medio paulo ampliatis, spinis 4 extus praeditis, spinis discoidalibus, 4, sulco unguiculari in medio, tibiis spinis 7 extus instructis, elytra hyalina, margine costali ciliata, apice rotundata, area costali venulis parallelis, nonnullis biramosis; pedes fragiles, ciliati; cerci cilindroconici; lamina supraanalis brevis.

O presente gênero difere dos demais gêneros incluídos no

grupo **Thespes** da subfamília **Thespiinae** por apresentar 7 espinhos externos nas tíbias anteriores.

Tipo: A espécie seguinte.

Metathespis modesta s. n.

Parvus. Characteribus generis. Pars media verticis oculos vix supcrans. Uniformiter tomentosus, elytris alisque translucidis, venis flavis. Elytra lata, apice rotundata, alis paulo breviora, extremitatem abdominis valde superantia.

Longitudo corporis	23,0 mm
Longitudo pronoti	6,0
Longitudo coxarum anticarum	4,5
Longitudo elytrorum	20,0

Pátria: Pretrópolis (Alto da Serra), Rio.

Col.: Mielke-Herbert, 2-11-60.

Tipo: Um macho algo mutilado, no laboratório do autor.

Metathespis precaria s. n.

Precedenti similis sed obscurior, pronoto nonnihl crassiore, femoribus anterioribus vix latioribus, venis elytrorum castaneo-obsuro anulatis.

Longitudo corporis	23 mm
Longitudo pronoti	5
Longitudo coxarum anticarum	4
Longitudo elytrorum	24

Pátria: Serra de Angra, E. da Guanabara.

Col.: Oiticica & Pearson, Outubro de 1952.

Tipo: Um macho bastante danificado, no lab. do autor.