

REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLV

MARÇO -- 1970

N. 1

NOVO GÊNERO DE THESPINAE (*Mantidae*)*

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de S. Paulo — Piracicaba

Navimons gen. n.

Statura gracilis. Caput pronoto valde latius, oculis permagnis, scutello frontali paulo latiore quam altiore, superne in medio rotundatim angulato, antennis ciliatis, ocellis magnis a se se vix sectis. Pronotum gracile, metazona quam prozona duplo longiore, dilatatione modica ad tertiam partem anteriorem, carinulatum, marginibus dentatis, prozona versus extremitatem modice attenuata, in medio triangulariter depressa, utrinque scabra, metazona in medio modice angustata, quam coxis anticis brevior, elevatione cordiforme ad marginem posticum praedita. Femora antica gracilia, superne subrecta, extus spinis 4. spinis discoidalibus 4. sulco unguiculari paulo ante medium. Tibiae anticae spinis 5 extus. Elytra membranosa, translucida, lata, subparalela, apice rotundata, vena radialis postica triramca ramis inter-se et cum ramis venae ulnae parallelis,

* Apresentado à II Reunião Anual da Soc. Bras. Entomologia, Recife, Dez. 1969.

venulis ad implantationem crassioribus ac obscurioribus reticulatum sat regularem designantibus, area constali lata, irregulariter venulosa, spinulis minutissimis densissime oblecta, venis ciliatis. Alae elytris similes. Pedes 4 posteriores hirsuti. Lamina subgenitalis margine postico rotundato, stylis coniciis instructa. Cerci cylindrici. Lamina supra analis triangularis, acuta.

O gênero se distingue pelo escutelo frontal muito alto e pelos élitros largos e regularmente reticulados, de nervuras pilosas.

Tipo: a espécie seguinte.

Navimons amapaensis sp. n.

♂ — Characteribus generis, colore castaneo-sordida, elytris alisque concoloribus, pedibus annulatis, femora antica macula castaneo-nigra intus ad sulcum unguicularem ornata.

Longitudo corporis	32 mm
Longitudo pronoti	8,5
Longitudo metanoti	5,5
Longitudo coxarum anticarum	7
Longitudo elytrorum	25
Latitudo elytrorum	9
Longitudo femorum posticorum	10

Pátria: Amapá, Serra do Navio

Col.: J. C. M. Carvalho, 1961.

Tipo: Um macho, na coleção do A.