

# REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

## DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLIV

DEZEMBRO - 1969

N. 4

## UM NOVO COIPHORÍDEO DO BRASIL

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz",

Universidade de S. Paulo — Piracicaba

### *Neoconocephalus corumbaensis* sp. n.

Robustus, testaceus, partim obscurus. Fastigium verticis a supero visum vix longius quam latius, antice rotundatum, subtus totum nigro-nitidum, basi distincte dentatum et a fronte divisum. Pronotum rugulosum, densissime puncturatum, disco postice quam antice valde latiore, margine postico rotundato, metazona in medio prope sulcum macula obscura inter strias divergentes, postice quam antice obscuriore, striis parallelis, lobis lateralibus aequae longioribus quam latioribus, margine inferiore angulato-rotundato, partim castaneo-nigris, elytra luteovirescentia, basi nigrescentia, apice rotundata, extremitatem femorum posteriorum valde superantia, punctis obscuris minutissimis uni-seriatis praedita. Thorax piceus, lobis meso et metasternalis angulosis. Femora I et II inferne inermia, extus irregulariter castaneo vittata, inferne utrinque spinis apice castaneis prope maculas castaneas implantatis, armata, lobis genicularibus spina parva praeditis. Tibiae I foraminibus in vittis nigris sitis, II basi utrinque nigro vittata, III prope basin macula nigra tantum. Tarsi lateraliter nigro vel castaneo vittati. Lamina supraanalis triangulariter bidentata. Lamina subgenitalis triangulariter incisa, atylis cylindricis, fragilibus ins-

tructa. Cerci crassi, breves, bidentati, dente infero quam supero multo robustiore.

Longitudo corporis . . . . .	35,0 mm
Longitudo pronoti . . . . .	9,8
Longitudo elytrorum . . . . .	50,0
Longitudo femorum post. . . . .	29,5

Pátria : Corumbá, Mato Grosso, Brasil.

Coletor : K. Ooshiro, 21-1-68.

Tipo : Um macho na coleção do A.

Apróxima-se de *N. maculosus* (Redtb.) do qual difere por ser maior, ter as carinas laterais do disco pronotal da mesma cor e as tíbias anteriores e médias não infuscadas.

#### IN MEMORIAM

**Prof. Carlos T. Mendes**

**Prof. N. Athanassof**

**Ex-diretores da REVISTA DE AGRICULTURA**