

DUAS NOVAS ESPÉCIES DE THESPINEAS DO BRASIL [Mantidae] *

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de S. Paulo — Piracicaba

Musoniella nana sp. n.

Mas -- Castaneo-badius, statura parva, oculis permagnis, rotundatis, vertice quadrisulcato, ad sulcos internos depressionem latam exhibente, ocellis a sese remotis, scutello frontali transverso, alto, superne obtuse angulato, antennis ciliatis, occipite maculis castaneo-nigris ornato. Pronotum forte, dilatatione regulariter rotundata in medio sita, marginibus minutissime dentatis, carinula humillima in medio, metazona quam prozona sesqui longiore, excrescentiis duabus ad extremitatem posteriorem, nonnullis minoribus et minus elevatis in disco. Coxae anteriores pronoto vix longiores, antice minutissime dentatae. Iubo parvulo ad extremitatem armatae. Femora antica longe-triangularia, superne recta, spinis externis 4, discoidalibus 4, sulco unguiculari in medio sito. Tibiae anticae spinis externis 5, spina apicali exclusa, anulo nigro in medio et macula nigra prope apicem ornatae. Elytra subhyalina, elongata, marginibus ciliata, extremitatem versus modice ampliata, apice rotundata, area costali irregulariter venulosa, disco venulis transversis nec incrassatis, nec infuscatis, vena radiali postica paulo pone medium divisa. Alae elytris similes.

| | |
|-------------------------------|-----|
| Longitudo corporis | |
| Longitudo pronoti | 3mm |
| Longitudo elytrorum | 13 |
| Latitudo elytrorum | 3 |

Pátria: Umberto Antunes, E. da Guanabara.

Col.: Dirce Lacombe, 23-1-1960.

Tipo: um macho mutilado, no Laboratório do A.

(*) Apresentado à I Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Entomologia, realizada na E. S. A. "Luiz de Queiroz", de 2 a 5 de Setembro de 1968.

Musoniella longicauda sp. n.

Uniformiter tomentosa. Oculi magni, rotundati, prominentes. Vertex leviter undulatus, linea dorsali subrecta. Scutellum frontale altissimum, superne in medio haud incisum. Pronotum minutissime obscure maculatum, carinulatum, prozona modice angusta, metazona subparella, dilatatione paulo ante medium, marginibus lateralibus dentatis. Coxae anteriores marginibus haud denticulatis. Spiniae femorum anticorum ac tiliarum apice obscuro. Sulcus unguicularis femorum anticorum macula obscura destitutus. Elytra angusta, elongata, subparalela, apice rotundata, translucida, venulis transversis ad insertionem modice crassioribus et obscurioribus. Alae hyalinae, iridescentes. Pedes uniformes, concolores. Cerci teretes, fragiles, longisissimi.

| | |
|-------------------------------|------|
| Longitudo corporis | 27mm |
| Longitudo pronoti | 7 |
| Longitudo elytrorum | 24 |
| Latitudo elytrorum | 5 |

Pátria: Poços de Caldas, (Morro do Ferro), E. de Minas Gerais, Brasil.

Col.: J. Becker, O. Roppo et O. Leoncini, 8-IX-66.

Tipo: Um macho, no Laboratório do A.

Difere das espécies afins pelo comprimento dos cercos.

IN MEMORIAM

Prof. Carlos T. Mendes

Prof. N. Athanassof

Ex-diretores da REVISTA DE AGRICULTURA