

NOTA SOBRE A OCORRÊNCIA DE *Eupalea reinhardti* Crotch. (Coleoptera, Coccinellidae) ATACANDO *Psylla* sp. (Homoptera, Psyllidae) EM SIBIPIRUNA (*Caesalpinia pelthophoroides* Benth.)

Alexandre Isaac Akerman Fraga¹
Evôneo Berti Filho²
Américo Iorio Ciociola¹

Em setembro de 1985, observou-se a ocorrência de um grande número de coccinelídeos em sibipiruna (*Caesalpinia pelthophoroides* Benth.) no campus da Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL), em Lavras, MG. Larvas e adultos atacavam psilídeos (*Psylla* sp.) que ocorrem nesse período, sugando as brotações novas das plantas. Sendo um coccinelídeo que ainda não havia sido constatado sobre a referida presa, foram enviados exemplares ao especialista, Dr. Robert Gordon, que os determinou como *Eupalea reinhardti* Crotch. Trata-se de uma espécie nova, do gênero, para o Brasil. Os adultos são de coloração amarelo palha, com duas manchas negras no ápice e na base dos élitros; pronoto e margem elitral de coloração alaranjada. As larvas são de coloração negra, com manchas alaranjadas. As pupas são de coloração alaranjada e a pupação ocorre nas folhas de sibipiruna. Outros dados biológicos estão sendo estudados, pelo fato desta espécie ser componente do complexo de coccinelídeos predadores de psilídeos em sibipiruna, entre os quais se destacam *Cycloneda conjugata* Mulsant e *Olla v-nigrum* (Mulsant).

¹ Escola Superior de Agricultura de Lavras, MG.

² Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", USP, Piracicaba.